

الصفحة 1/1 Sidan

الحيوانات الضارة في البيت

معلومات ونصائح إلى من يسكن في شقة إيجار

الصفحة 2/2 Sidan

إذا اكتشفت وجود حيوانات ضارة في شقتك، فيجب عليك أن تتصل بالمؤجر بأسرع وقت ممكن لمنع انتشارها. ويوصفك مستأجراً فمن المهم جداً أن تتعاون أثناء أعمال التطهير والمعالجة التي تليها وتلتزم بالتعليمات التي تحصل عليها كيلا تعود الحيوانات الضارة.

الصفحة 3/3 Sidan

أمثلة عن الحيوانات الضارة

توجد أنواع عديدة من الحيوانات الضارة:

- بعضها يُلحِق الأذى بالطعام والمنسوجات، مثل سوسة الطحين أو لِحِسة السِّكَّر أو خنفساء الفرو.
- وبعضها يزعج الإنسان، مثل البراغيث والقمل.
- وبعضها يُلحِق الأذى بالخشب، مثل آكل الخشب.

بق الفراش والصراصير

بدأ بق الفراش والصراصير بالانتشار أكثر في الآونة الأخيرة في السويد. لذلك كن أكثر انتباهاً، واتصل بالمؤجر فوراً إذا شاهدتها في شقتك، واتبع التعليمات التي تحصل عليها.

بق الفراش

ينشط بق الفراش ليلاً ويعيش على امتصاص دم الإنسان. ويبلغ طوله 5 – 8 ميلليمتر، ويميل لونه إلى البني الداكن، وهو يشبه الخنافس المُسطَّحة الصغيرة.

من علامات وجود بق الفراش في شقتك: فضلاته السوداء ويقع الدم على الشراشف والظفح الجلدي على الجسم بعد اللدغة. وإذا كنت غير متأكد، فما عليك سوى أن تضع شريطاً لاصقاً من طرفيه حول قاعدة السرير. وفي حال وجود بق الفراش فإنه سوف يلتصق بالشريط خلال بضعة أيام. ولكن أكثر انتباهاً عندما تجلب إلى بيتك أثاثاً مستعملاً، مثل الأرائك والأسيرة، فقد تكون سبباً في انتشار بق الفراش. يجب تطهير المكان للتخلص من بق الفراش. وكلما اكتشفت وجود بق الفراش بسرعة، كان من الأسهل التخلص منه.

نصائح تساعدك على تفادي بق الفراش عندما تسافر:

- ضع ملابسك وأغراضك الأخرى في أكياس بلاستيكية مُحكَّمة الإغلاق.
- ضع أمتعتك في الحمام.
- تفحص السرير والأثاث القريب من السرير. وابحث عن آثار بق الفراش في الجانب السفلي من السرير وتحت الفرشة.
- تجنّب وضع الحقائب على السرير أو تحته.

بعد العودة من السفر:

قم بتفريغ حقيبتك في مكان ذي إنارة قوية بعيداً عن المنسوجات الموجودة في البيت (وليس على السرير). وإجراء وقائي إضافي، فإنه من المفيد أن تغسل كل ملابسك وتجفّفها بالمُجفّف أو أن تضع كل ملابسك في المُجمّدة بعد عودتك إلى البيت مباشرة.

الصراصير

يمكن أن تأكل الصراصير من المواد الغذائية وأن توسّخها وأن تسبب رائحة كريهة. كما أنها تُلحِق الأذى بالمنسوجات والأوراق والجلود. ويمكن أن تنشر الصراصير العدوى، وهي تُعتبر ضرراً على الصحة.

يبلغ طول الصرصور 12 – 16 ميلليمترًا. وهو يفضل أن يكون قرب الأفران ومواسير التدفئة ومحركات التلاجات وغيرها من الأماكن التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 25 – 33 درجة مئوية. وهو لا يجب الضوء ويختبئ في الأماكن المظلمة والشقوق الضيقة.

نصائح تساعد على تفادي الصراصير:

- التنظيف والمحافظة على النظافة في البيت، وبذلك لا تترك طعاماً للصراصير.
- احتفظ بالمواد الغذائية في صناديق مغلقة أو في أكياس نيلون كتيمة.
- قم بتفريغ كيس القمامة مرات عديدة كيلا تجذب رائحة الطعام الحشرات.
- لا تترك طعام الحيوانات المنزلية مكشوفاً فترة طويلة.
- انتبه إلى الأماكن المصابة برطوبة في بيتك، لأن الصراصير تفضل هذه الأماكن.

إذا كنت تشتبه بوجود صراصير في بيتك،
فإننا ننصحك بأن تسحب الفرش من مكانه،
لأن الصراصير تختبئ هناك دائماً تقريباً.

الحيوانات الضارة الأكبر حجماً

لا تُطعم الطيور من على الشرفة (البلكون) أو في الفسحة الخارجية، لأن الطعام المتناثر يجذب الجرذان والفئران. وإذا اكتشفت وجود جرذان أو فئران في شقتك أو في مكان آخر من المبنى، فاتصل بالمؤجر أو بشركة التطهير من الحيوانات الضارة التي تعاقدت معها لكي تقدم لك المساعدة.

الصفحة 4/4 Sidan

الحيوانات الضارة الشائعة

Pälsänger & pälsängerlarv	خنفساء الفرو & يرقة خنفساء الفرو
Vågbandad pälsänger	خنفساء الفرو المتموجة
Brödbagge	خنفساء الصيدلية
Fläskänger	خنفساء الخنزير
Husbock	آكل الخشب
Mjölbagge & mjölbaggelarv	سوسة الطحين & يرقة سوسة الطحين
Klädlus	قملة الجسم
Loppa	البرغوث
Dammlus	قملة الكتب
Vägglus	بقعة الفراش
Fruktmott	عثة الفواكه
Mottlarv	يرقة العث
Faraomyra	نملة فرعونية
Silverfisk	لاجسة السكر
Kvalster	عثة
Fågelkvalster	عثة الطيور
Klädesmal	عثة الملابس
Råtta	جرذ
Mus	فأرة
Kackerlacka	صرصور

اتصل بالمؤجر مباشرة إذا كنت تشتبه بوجود حيوانات ضارة في شقتك. واتبع التعليمات التي تحصل عليها عند التطهير.